

Die Schlingnatter, gladde slang, *Coronella austriaca* im Lüsekamp und Boschbeekdal



Anlass

- FFH-Art
- Bestandserfassung alle 6 Jahre
- Mai bis Oktober 2011
- 10 Begehungen pro Fläche
- 5 untersuchte Flächen
 - 2 Elmpter Schwalmbruch
 - 2 Lüsekamp
 - 1 Boschbeektal

Erfassungshilfen



- Künstliche Verstecke
 - Holzbretter (ca. 50x150cm)
 - Bitumenpappe (ca. 50x50cm)
- Anzahl pro Transekt
 - jeweils 5-9 Bretter
 - und 3-4 Pappen

Wildschweine - wilde zwijn



Lage der Transekte



Elmpter Schwalbbruch



Lüsekamp und Boschbeektal

Individuelle Wiedererkennung

- Fotografie und Vergleich der Kopf- und Nackenmuster




Individuum 2 aus Lüsekamp

Dipl.-Biol. Anja You


Ergebnisse

- 21 Beobachtungen
- 11 Individuen
- Individuen pro Fundort:
 - 1 Tier Elmpter Schwalmbruch
 - 8 Tiere Lüsekamp
 - 2 Tiere Boschbeektal


Individuen pro Gebiet



Beobachtungen nach Fundort



Beobachtungshäufigkeit pro Monat





Individuum 1



Individuum 2



Individuum 3



Individuum 4



Individuum 5



Individuum 6



Individuum 7



Individuum 8



Individuum 9



Individuum 10



Individuum 11

Vielen Dank – Dank u wel!



Dipl.-Biol. Anja You