

# Ausbreitung des Neuntöters in der Grenzregion

*Verspreiding van de Grauwe Klauwier in de grensregio*

25. November 2023

Silvia Peerenboom



# Merkmale

- Typische Würgermaske;  
beim Männchen breit schwarz,  
beim Weibchen schmal braun.
- Männchen:
  - Hellgrauer Oberkopf
  - Rücken und Flügel  
kastanienbraun
  - Unterseite weißlich mit  
rostbraunem Anflug.
- Weibchen:
  - Oberkopf grau-braun.
  - Rücken matt rostbraun.



Der Neuntöter gehört zu den **-Langstreckenziehern-**.

Er zieht aus allen Teilen Europas nach Südosten über Griechenland und das östliche Mittelmeer nach Ost- und Südafrika.

## Phänologie:

Laut Literatur Ende April / Anfang Mai - September im Brutgebiet.

Im Kreis Viersen:

Früheste Erstbeobachtung: 28.4.2018. Ansonsten Anfang Mai.

Späteste Letztbeobachtung: 8.9.2020. Ansonsten Mitte-Ende August.

Fazit:

Klimawandel führt nicht zu früherem Eintreffen im Brutgebiet.

# Lebensraum

- Offene (Kultur-) Landschaften mit extensiv genutzten Wiesen und Weiden oder Heiden sowie
- Hecken und Dornengebüsch (Brutplatz sowie Vorratsspeicher für Notzeiten u. Fütterung der Jungen),
- wo noch Vieh gehalten wird (dort gibt es viele Insekten),
- mit größeren kurzrasigen und/oder vegetationsarmen Flächen und
- sonnigen und trockenen Plätzen zum Sonnen- und Staubbaden.






# Verbreitung

- In Europa von Nordspanien bis Skandinavien mit Ausnahme von Großbritannien, Irland, Island und Nordskandinavien.
- Vor 100 Jahren in NRW und NL weit verbreitet, häufig
- Danach starker Rückgang bis 1980, regional ausgestorben
- Ab 1990er Jahre wieder Zunahme, wohl ausgehend von den starken Zunahmen in der Wallonie und Süd-/Ostdeutschland



# Brutbestand Grenzregion

- In der Grenzregion von 1980 bis 2005 praktisch ausgestorben (0-1 Paare)
- Seit 2010 wieder im Kreis Viersen
- Danach stetige Zunahme
- 2015 brüteten 7 Paare in der Grenzregion!





# Brutbestand Entwicklung







- In beiden Gebieten Höchstbestand in den Jahren 2020 und 2021.
- 2022 wieder abnehmend.
- Anstieg 2023 im Kreis Viersen begründet in flächendeckender Erfassung.

Daten: Stichting Koekeloere



# Verbreitung im Grenzgebiet





# Einflussfaktoren auf den Brutbestand

- Klimatische Veränderungen  
Neuntöter ist wärmeliebende Art; nasse Phasen während der Brutperiode wirken sich negativ auf die Populationsentwicklung aus.
- Habitatzustand im Brutgebiet  
Brutplatzangebot Hecken, extensive Bewirtschaftung, kein Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln, Nahrungsangebot (Beweidung mit Vieh).
- Verfolgung auf dem Zugweg
- möglicherweise Verbesserungen in den Überwinterungsgebieten.



**Vielen Dank fürs Zuhören**

**Fazit:**

Für den Neuntöter geht es  
in der Grenzregion wieder  
aufwärts!

Fotos: Hans-Georg Wende



K. Michler